

Guida identificativa alle specie aliene invasive di interesse unionale

Specie trattate:

Acridotheres tristis (pag. 2)

- Specie simili (pag. 5)

Illustrazioni: Massimiliano Lipperi, Studio Wildart

Traduzione: Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali (UAGRA), Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell'Insubria

Acridotheres tristis

Maina comune

Sinonimi

Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766), *Paradisea tristis* (Linnaeus, 1766), *Sturnus tristis* (Linnaeus, 1766), *Acridotheres griseus*

ID specie

Regno: Metazoa
Phylum: Chordata
Classe: Aves
Ordine: Passeriformes
Famiglia: Sturnidae
Genere: *Acridotheres*
Specie: *Acridotheres tristis*


Descrizione generale:

Uccello passeriforme di dimensioni simili allo storno comune. Il piumaggio del corpo dell'adulto è di color marrone cioccolato chiaro, con testa, collo e parte alta del petto nero lucido. Presenta macchie bianche sulle ali, chiaramente visibili in volo. Piume bianche presenti sui margini, sulla punta e sul lato inferiore della coda. Gambe, zampe e becco giallo brillante. La caratteristica più distintiva è la pelle nuda di colore giallo brillante sotto e dietro all'occhio. L'iride varia dal grigio-marrone, al marrone, al giallo-marrone fino al rosso. Maschi e femmine sono molto simili e impossibili da distinguere sulla base della morfologia. La colorazione dei giovani è simile agli adulti ma più opaca. Le uova sono di colore blu turchese (dimensioni medie: 30.8 x 21.99 mm). La specie è molto rumorosa e capace di emettere una ampia varietà di richiami, da gracidii aspri a fischi sommessi.



Dimensioni: Lunghezza del corpo 23-26 cm; lunghezza della coda 7.9-9.6 cm; lunghezza dell'ala 13.8-15.3 cm; peso medio 110-138 g

Caratteristiche distintive




Apertura alare media 38 cm.

Grande macchia bianca sull'ala.

Parte bianca sotto coda.

Punte bianche sui margini della coda.

Lunghezza della coda: 7.9-9.6 cm.



Specie simili

Alcune caratteristiche distintive, in particolare la peculiare colorazione della testa, rendono semplice l'identificazione della maina comune, anche per gli osservatori non esperti.

Identificazione in campo

La corretta identificazione in campo è resa più semplice dal fatto che la maina comune è conosciuta per il suo comportamento estroverso e per stare a stretto contatto con l'uomo. Questo permette un maggior tempo di osservazione a distanze ridotte, facilitando l'esaminazione degli individui appollaiati o che camminano sul terreno prima di spiccare il volo. Le condizioni favorevoli di osservazione permettono di evitare confusione tra gli adulti di maina comune e altre specie native di uccelli europei. In base alle dimensioni simili, proporzioni del corpo, becco giallo e piumaggio scuro, la maina comune può essere confusa con lo storno comune (*Sturnus vulgaris*) e con lo storno nero (*S. unicolor*). Tuttavia, le tre specie possono essere confuse solo a grande distanza e per un breve periodo di osservazione.

Il tempo disponibile per identificare una maina comune in volo è breve a causa del suo volo veloce e diretto. Il tipo di volo non è molto caratteristico, con repentino sbattere di ali alternato a brevi intervalli di planata, che la rendono simile a molti altri uccelli europei. Se il pattern della testa non può essere visto chiaramente, il tratto caratteristico più distintivo durante il volo sono le grandi macchie che ricoprono metà delle ali, sia sulla parte inferiore che superiore. Questo pattern non si trova in nessun altro uccello europeo di simili dimensioni e può essere confuso solo con specie non native dell'Europa, dove sono state segnalate solo sporadicamente in seguito a fuga dalla cattività.

La maina comune nidifica in diverse tipologie di cavità, incluse cavità naturali degli alberi e cavità artificiali in strutture di natura antropica. Il nido è composto da ramoscelli, erba e grande varietà di spazzatura. In generale, il nido non è molto caratteristico e, in combinazione con la sua inaccessibilità, non molto utile per identificare la specie che lo occupa. Tuttavia, la maina comune è nota per difendere i siti di accoppiamento, dunque la presenza degli adulti nelle vicinanze dei nidi è facilmente evidenziabile.

Identificazione in commercio

Le stesse considerazioni riportate sopra per l'identificazione degli uccelli in campo possono essere applicate per individui in cattività, sia adulti che giovani. Al contrario, le uova della maina comune, che possono essere oggetto di commercio in Europa, sono difficilmente distinguibili dalle uova di alcune specie native di uccelli europei, tra cui lo storno europeo, lo storno nero e il tordo bottaccio (*Turdus philomelos*).

Per quanto riguarda gli individui adulti, una mala identificazione, sebbene improbabile, può essere possibile solo se si parla di specie non native dell'Europa. Nell'esempio successivo i tratti caratteristici distintivi della maina comune sono comparati a quelli di specie pet e commercializzate in Europa, ma non rilevate in natura nel continente europeo, o con singole segnalazioni o piccole popolazioni, come nel caso della maina della giungla (*Acridotheres fuscus*), della maina degli argini (*Acridotheres ginginianus*) e della maina cretata (*Acridotheres cristatellus*).

<p>Maina comune</p>	<p>Merlo indiano <i>Gracula religiosa</i> Gracula dello Sri Lanka <i>G. ptilogenys</i>¹</p>
 <p>Parti gialle limitate alla testa. Bargigli assenti. Becco giallo e snello. Testa arrotondata.</p>	 <p>Ampie parti gialle sulla testa. Bargigli carnosi di colore giallo. Becco massiccio arancione e giallo. Testa appiattita.</p>
<p>Grande maina (Maina dal ventre bianco) <i>Acridotheres grandis</i></p>	<p>Maina della giungla <i>Acridotheres fuscus</i></p>
 <p>Pelle nuda assente sulla testa. Cresta sulla fronte.</p>	 <p>Pelle nuda assente sulla testa. Cresta sulla fronte. Becco con base scura.</p>
<p>Maina degli argini <i>Acridotheres ginginianus</i></p>	<p>Maina crestatata <i>Acridotheres cristatellus</i></p>
 <p>Pelle nuda rossa sulla testa. Becco rosso. Occhio rosso.</p>	 <p>Pelle nuda assente sulla testa. Cresta sulla fronte. Becco chiaro. Occhio arancione-rosso.</p>

¹ Il merlo indiano e la maina dello Sri Lanka sono simili (si considerava fossero la stessa specie); solo il merlo (maina) indiano è illustrato.

Nomi comuni

BG	Обикновена майна
HR	-
CS	Majna obecná
DA	Almindelig mynah
NL	Treurmaina
EN	Common myna
ET	Mainakuldnokk
FI	Pihamaina
FR	Martin triste
DE	Hirtenmaina
EL	Κοινή μάινα
HU	Pásztormejnó

GA	Míona coiteann
IT	Maina comune
LV	Parastā maina
LT	Paprastoji maina
MT	Il-majna
PL	Majna brunatna
PT	Mainá-indiano
RO	Myna indiană
SK	Škorec hnedý
SL	Žalostna majna
ES	Miná común
SV	Brun majna

Bibliografia

CABI, 2009. *Acridotheres tristis*. In: *Invasive Species Compendium*. Wallingford, UK: CABInternational. www.cabi.org/isc [Accessed 24 August 2020]

Global Invasive Species Database (2020) Species profile: Acridotheres tristis. Downloaded from <http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Acridotheres+tristis> on 24-08-2020.